

确诊时间 （ 2018/6/7

）

突变类型 （

21-L858R

）

转移说明	治疗日期	绝对时间	治疗手段及药物名称	评估疗效	其它肿标异常	体感
	2018. 4. 27		体检 CEA:43. 19	无	CEA:43. 19	正常
	2018. 5. 11		再次验血 CEA:45. 93	无	CEA:45. 93 CA199:8. 38 CA125:9. 3 CA153:23 AFP:2. 85	正常
骨转	2018. 6. 7		再次验血 CEA:50. 93 ; PETCT:C6/T8/右侧髂骨转移, 右下肺伴堵塞性肺炎可能 ; 脑部增强MR:右侧半卵圆中心异常信号, 缺血灶可能 ; 胸部CT:右侧36. 5mm#27mm, 胸椎骨质破坏	无	CEA:50. 93 SCCA:0. 32 NSE:12. 49 CYFRA21-1: 1. 36 AFP:2. 54 GRP:62. 51	正常
骨转	2018. 6. 18		开始服用易瑞沙, 胸部穿刺, 基因检测确诊肺腺癌, 21-L858R 突变			正常
骨转	2018. 6. 29		服用易瑞沙11天 CEA:43. 74, 下降14%		CEA:43. 74 SCCA:1. 1 NSE:11. 74 CYFRA21-1: 1. 24 AFP:2. 64	正常

骨转	2018.7.12		服用易瑞沙约20天，CEA:33.28, 下降24%，CYFRA21-1: 3.38		CEA:33.28 SCCA:1.1 NSE:10.92 CYFRA21-1: 3.38 AFP:2.64 CA125:9.4 CA153:20.9 CA72-4:0.609 糖类抗原50:4.52	正常
骨转	2018.8.7		服用易瑞沙约45天，CEA:25.80, 下降22.5%，CYFRA21-1: 1.96 胸部CT:36MM，右肺中叶及左肺舌段少许炎症	实体变淡	CEA:25.8 SCCA:1.0 NSE:11.69 CYFRA21-1: 1.96 AFP:3.19 CA125:9.3 CA153:18.7 CA72-4:1.11	正常
骨转	2018.9.15		服用易瑞沙约80天，CEA:20.35, 下降21%，CYFRA21-1: 2.61 白细胞: 3.67, ALT:75, AST:54, 尿酸: 407 胸部CT:36MM，右肺中叶及左肺舌段少许炎症	实体变淡	CEA:20.35 NSE:17.54 CYFRA21-1: 2.61 AFP:2.92	正常
骨转	2018.10.22		服用易瑞沙约110天，CEA:19.91, 下降21%，CYFRA21-1: 2.56 白细胞: 3.67, GGT:68, AST:90, LAP:83, 肝胆酸: 13.7 骨扫描: 颈椎、第八胸椎、右侧髂骨异常放射浓聚	实体变淡	CEA:19.91 NSE:16.62 CYFRA21-1: 2.56 AFP:3.42	正常

骨转	2018. 11. 12		服用易瑞沙约130天，CEA:18. 01, 下降9. 5%，	实体变淡	CEA:18. 01 NSE:17. 4 CYFRA21-1: 1. 94 ca199:11. 78	正常
骨转	2018. 12. 18		服用易瑞沙约165天，CEA:15. 74, 下降12. 6%，	实体变淡	CEA:15. 74 AFP:3. 03 CYFRA21-1: 6. 67	正常
骨转	2019. 1. 7		服用易瑞沙约185天，CEA:14. 69, 下降6. 7%，	实体变淡	CEA:14. 69 CYFRA21-1: 3. 1	正常
骨转	2019. 1. 21		服用易瑞沙约200天，CEA:16. 33, 升高11. 16%，	实体变淡	CEA:16. 33 CYFRA21-1: 2. 21	正常
骨转	2019. 2. 11		服用易瑞沙约220天，CEA:13. 63, 下降16. 53%，	实体变淡	CEA:13. 63	正常
骨转	2019. 3. 18		服用易瑞沙约260天，CEA:13. 83, 升高1. 47%，	实体变淡	CEA:13. 84	正常
骨转	2019. 4. 16		服用易瑞沙约290天，CEA:13. 67, 下降1. 15%，	实体变淡	CEA:13. 67	正常

骨转	2019.5.20		服用易瑞沙约325天, CEA:14.03, 升高2.63%,		CEA:14.03	正常
骨转	2019.6.10		服用易瑞沙约350天, CEA:14.25, 升高1.56%,		CEA:14.25	正常
骨转	2019.7.1		，服用易瑞沙约380天, CT显示与2019年4月底片子比较 密度增高	实体密度增	未检测	正常
骨转	2019.7.9		服用易瑞沙390天, CEA12.61, 降低11.5%		CEA:12.61	正常
骨转、脑 转	2019.7.30		服用易瑞沙400天, CEA13.06, 升高3.5%	CEA13.06, CYFRA21-1 2.26		正常
骨转、脑 转	2019.8.5		服用易瑞沙405天, 胸部CT平扫与7月初相仿, 脑内多发 转移瘤, 最大尺寸0.7cm	确诊脑转		正常
骨转、脑 转	2019.8.6		开始服用白盒9291, 每天80mg	确诊脑转		正常
骨转、脑 转	2019.8.20	420天	服用白盒9291, 15天, CEA11.31, 降低13.4%	确诊脑转	CEA11.31	正常

骨转、脑转	2019. 9. 7		服用白盒9291, , 33天, CEA9. 43, 降低16. 6%, NSE22. 91 ; 胸部CT, 脑部增强	脑部明显缩小, 肺部缩小	CEA9. 43, NSE22. 91	正常
骨转、脑转	2019. 9. 29	465天	服用白盒9291, 55天, CEA9. 51, 升高0. 85%, NSE14. 23 ; 胸部CT, 脑部增强	无影像数据支撑	CEA9. 51, 升高0. 85%, NSE14. 23	正常
骨转、脑转	2019. 9. 30		开始服用特罗凯			
骨转、脑转	2019. 10. 14		服用特罗凯15天, CEA8. 79, 降低7. 6%, NSE14. 29 ;	无影像数据支撑	CEA8. 79, 降低7. 6%, NSE14. 29	正常
骨转、脑转	2019. 10. 26		服用特罗凯27天,	脑部增强显示病灶继续变小, 几乎不可见;	CEA待查	正常
骨转、脑转	2019. 10. 30	495天	服用特罗凯30天, CEA9. 76, 升高11%	肺部影像判断与九月初比较密度增加, 与7月	CEA9. 76, 升高11%; NSE13. 32, 特罗凯无效?	正常
骨转、脑转	2019. 11. 30	525天	服用9291, 30天, CEA9. 57. 降低2%	无影像数据支撑	CEA9. 57. 降低2%。NSE12. 67	正常
骨转、脑转	2019. 12. 06	561	9291, 36天, CEA7. 01, 降低, 降低26%。(检测医院不同)	无影像数据支撑	, CEA7. 0, 降低, 降低26%, 9291有效	感冒
骨转、脑转	2019. 12. 06		开始特罗凯联合贝伐单抗第一次,	无影像数据支撑		

骨转、脑转	2019.12.27	582	特罗凯21天，联合贝伐单抗第二次，CEA6.4,降低8.5%	无影像数据支撑	9291效果持续？贝伐效果起效？	右手肩膀抬起费力
骨转、脑转	2020.1.15	600	特罗凯42天，联合贝伐单抗第三次，CEA7.07,升高10.46%	无影像数据支撑	特罗凯无效？	右手肩膀抬起费力
骨转、脑转	2020.2.13	623	特罗凯65天。CEA15.71, NSE20.81, CEA升高122.2%	无影像数据支撑	特罗凯无效？主力靶点？	右手肩膀抬起费力
骨转、脑转	2020.3.4	643	9291, 14天, CEA19.01, CEA升高21%	无影像数据支撑	9291无效？主力靶点？	右手肩膀抬起费力
骨转、脑转	2020.3.12	651	胸部CT, 脑部增强, 骨扫描	原发病灶缓解	肺部病灶部分缓解, 贝伐有效？确诊后原发病灶效果最好一次。脑部无变化。图	体重减轻, 容易疲劳, 右手肩膀抬起费力
骨转、脑转	2020.3.19	658	9291, 14天, CEA22.21, NSE13.13, CEA升高16.8%		CEA一直敏感, 9291无效？主力靶点？原发病灶缓解, CEA却升	体重减轻, 容易疲劳, 右手肩膀抬起费力
骨转、脑转	2020.4.2	672	9291, 100mg, 14天, CEA24.96, CEA升高12.38%		CEA持续升高	体重减轻, 容易疲劳, 右手肩膀抬起费力
骨转、脑转	2020.4.16	690	9291, 80mg, 14天, 联合184, 45mg, 吃5停2, CEA24.98, NSE12.25		联合184二周CEA未涨, CMET?	体重减轻10斤, 容易疲劳, , 胃部胀气, 皮疹亚重
骨转、脑转	2020.4.22	691	9291, 80mg, 7天, CEA28.14, 上涨12.65%, NSE14.55, 上涨18.77%		单药9291无效	体重减轻, 容易疲劳, 胃部胀气, 皮疹消

骨转、脑转	2020. 4. 23		9291联合184			体重减轻，容易疲劳，胃部胀气，皮疹消
骨转、脑转、淋巴转移	2020. 4. 27	701	PETCT, 双侧腋窝淋巴转移瘤待查，纵膈小淋巴结显示（无糖代谢增高），腋下淋巴过小，无法穿刺。		肺部稳定，头部稳定，腋下淋巴转移，纵膈小淋	体重减轻，容易疲劳，胃部胀气，皮疹消
骨转、脑转、淋巴转移	2020. 5. 8		9291，联合184，45mg, 吃5停2，CEA32. 11, 上涨14. 11%，NSE16. 09, 上涨10. 58%	无效		体重减轻，容易疲劳，胃部胀气，皮疹消
骨转、脑转、淋巴转移	2020. 5. 18		2992，60mg, 联合280，200mg*2，8天，CEA36. 95，上涨15%，NSE14. 49, 下降9. 94%	无效		体重减轻，容易疲劳，胃部胀气，皮疹消